

Informace pro použití, čtěte pozorně!

## BuroVax®

### Forma zdravotnického prostředku:

Ušní kapky

### Výrobce zdravotnického prostředku:

GALVEX, spol. s r. o., Jegorovova 37,  
974 01 Banská Bystrica,  
Slovenská republika

### Složení zdravotnického prostředku:

1 g roztoku obsahuje:  
aluminii acetotartratis solutio (s obsahem  
1,4% hliníku) 667 mg,  
ethanolum 96% V/V, aqua purificata.

### Charakteristika:

Ušní kapky BuroVax® je alkoholový roztok octanu a vinanu hlinitého určený k lokálnímu (místnímu) podání do ucha. Vyznačuje se hlavně adstringentním účinkem (stahujícím), přičemž působí i antisepticky (ničí choroboplodné zárodky), antiedematózní (působí proti otoku) a chladivě. Adstringentní látky reagují s bílkovinami povrchových vrstev tkáně za vzniku ochranné vrstvy, čímž se zlepšuje hojení a epitelizace tkáně, snižuje se dráždivost a zabraňuje se dalšímu pronikání infekce.

### Použití:

Přípravek se používá k podpůrné léčbě při akutním zánětu středního ucha a omevněních zevního zvukovodu. Je vhodný pro dospělé, mladistvé a děti.

### Nepoužívat v případě:

Přípravek se nesmí použít při přecitlivělosti na jednotlivé složky.

### Možné lokální reakce:

Jsou vzácné, ojediněle se může po aplikaci vyskytnout podráždění kůže zvukovodu.

Při případném výskytu těchto nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším používání přípravku poraďte s lékařem.

### Interakce:

Při lokální aplikaci nebyly zaznamenány. Není vhodné přípravek kombinovat s jinými lokálně podávanými léky do uší bez doporučení lékaře.

### Dávkování a způsob podání:

Doporučuje se do očištěného zvukovodu aplikovat 2 – 4 kapky 3 až 4krát denně. Před samotným podáním je nutno odšroubovat uzávěr, naklonit hlavu na stranu a jemným stiskem plastové lahvičky nakapat do zvukovodu potřebný počet kapek. Po použití je třeba uzávěr pevně zašroubovat.

### Upozornění:

V případě náhodného vniknutí přípravku do oka je nutno jej okamžitě vypláchnout vlažnou vodou.

### Uchovávání:

Uchovávat v dobře uzavřeném obalu při teplotě do 25°C, chránit před mrazem a přímým slunečním světlem. Uchovávat mimo dosah dětí. Přípravek se nesmí použít po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

### Balení:

20 g roztoku

### Datum poslední revize:

04/2023



2-23

